

“Efecto Macklin” en el neumomediastino espontáneo Macklin Effect in Spontaneous Pneumomediastinum

Stefanya Geraldine Bermúdez Moyano¹ <https://orcid.org/0000-0002-2259-6517>

Juan Santiago Serna Trejos^{2*} <https://orcid.org/0000-0002-3140-8995>

Juan Camilo Ángel Medina¹ <https://orcid.org/0000-0002-2517-052X>

¹Hospital Universitario del Valle. Cali, Colombia.

²Centro Médico Imbanaco. Cali, Colombia.

* Autor para la correspondencia: juansantiagosernatrejos@gmail.com

Recibido: 24/10/2023

Aceptado: 30/10/2023

Se demuestra la presencia de neumomediastino que, mediante el efecto Macklin, puede producir disección de mediastino anterior medio y posterior. Se ilustra en corte coronal neumomediastino que abarca la región cervical y posteriormente, genera una disección de las paredes cardíacas. Se observa neumomediastino de gran trayecto sin evidenciar ruptura o compromiso esofágico (fig.).




Fig. Tomografía computada de tórax contrastada.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

Financiamiento

Los autores de imagen en medicina “Efecto Macklin” en el neumomediastino espontáneo, autofinanciaron el proyecto de investigación.