

Resultado del tratamiento de la sífilis con P. A. M. ()

(Revisión de 39 casos)

Por el Dr. FRANCISCO A. LAVÍN DOMÍNGUEZ

No se aporta nada nuevo en el presente trabajo, en el que se valora el resultado del tratamiento con un curso de Penicilina en 39 pacientes.

Mucho se ha escrito, tanto en nuestro país como en el extranjero sobre esta materia, presentando casuísticas mayores que la nuestra y con resultados parecidos.

Los casos pertenecen al archivo del antiguo Dispensario Central del Patronato para la Profilaxis de la Sífilis,

Lepra y Enfermedades Cutáneas, sustituido actualmente por el Departamento Dermatológico del Hospital Docente "General Calixto García".

No se escogieron. Se citaron más de 200 enfermos y de los que concurrieron, solo se presentan aquellos que cumplieron con los requisitos exigidos: Exámenes complementarios que demostraron el estado actual de su enfermedad.

La Penicilina que se empleó es la conocida como P. A. M., es decir, Penicilina G. Procaínica en Aceite con Mono-

SEROLOGÍA

Diag.	Casos	Tratam.	1-3 M.	3-6 M.	Actual	L.C.R.	C.V.	Ojos
ZRAS (e-)	4	PAM-9m 4	+ : 1 — : 3	+ : 0 — : 4	+ : 0 — : 4	P : 0 N : 4	P : 0 N : 4	P : 0 N : 4
ZRAS (c-)	7	7	+ : 5 + : 2	+ : 0 + : 1	P : 0 — : 7	P : 0 N : 7	P : 0 N : 7	P : 0 N : 7
ZRAS (cm)	13	13	+ : 1° — : 3	+ _ 3 — : 10	+ : « — : 13	P : 0 N : 13	P : 1(1) N : 12	P : 0 N : 13
ZRAL	10	10	+ : 8 — : 2	+ : 8 — : 2	+ : 0 — : 10	P : 0 N : 10	P : 1(2) N : 9	P : 0 N : 10
TOTAL	39	5	+ = 4 — : 1	+ : 2 — : 3	+ : 0 — : 5	P : 0 N : 5	P : 1 (3) N : 4	P : 0 N : 5

A : Adquirida. L: Latente. T: Tardía. R: Reciente. P: Patológica. N: Normal. S: Sintomática. Z: Sífilis.

c: Chancro, cm: Cutáneo-mucosa. (+) Serología positiva. (—) Serología negativa. (1) Hipertensión Nefrónica. (2) Mitral Reumatismo. (3) Aortitis previo tratamiento.

estearato de Aluminio al 2 por ciento. La dosis total fue de 9 millones de unidades en 15 inyecciones de 600.000 unidades, 3 veces a la semana.

Como verán en el cuadro, nuestro grupo se compone de 39 enfermos, 34 de sífilis reciente y 5 de sífilis tardía, todas adquiridas.

Llamamos la atención de ustedes que estamos empleando por primera vez la Clasificación para Sífilis aceptada por el Ministerio de Salud Pública, a ponencia del Profesor Dr. Carlos Castañedo Pardo, en el Fórum de Higiene y Epidemiología, celebrado el pasado año.

De los 39, pertenecen 29 al sexo masculino y 10 al femenino, con edades que van desde los 14 a los 53 años.

Iniciaron el tratamiento hace más de 3 años, 30 casos, 8 más de 5 años, 1 hace 8 años.

Toleraron bien la Penicilina presentando reacción febril Herxheimer el 40 por ciento de sífilis reciente sintomática.

Actualmente todos están seronegativos, su líquido cefalorraquídeo es normal, no presentan alteraciones oculares y, en cuanto, a los 3 casos de patología cardiovascular, debe aclararse lo siguiente :

El No. 1 con hipertensión arterial, padece de litiasis renal, habiendo estado ingresado en varias oportunidades en la sala "Albarrán", del "Calixto García".

El No. 2, con enfermedad mitral. En sus antecedentes patológicos personales hay historia de reumatismo.

El No. 3, con aortitis, es un hombre actualmente de 27 años que clínicamente se siente muy bien y su afección pudiera atribuirse a la sífilis, ya que dejó transcurrir cuatro años entre la aparición de la lesión inicial y el momento de empezar la terapéutica penicilínica.

RESUMEN

Se presentan 39 casos, 34, de sífilis reciente y 5 de sífilis tardía, tratados con

penicilina G. procaínica en aceite con menoestearato de aluminio al 2 por ciento (P. A. M.), en dosis de 600.000 unidades 3 veces a la semana, basta completar 9 millones como dosis total.

Actualmente todos están seronegativos y clínicamente normales, no pudiéndose atribuir a fallos de tratamiento los 3 que presentan patología cardiovascular.

COMENTARIO

Se confirma una vez más la eficacia del tratamiento de la sífilis con penicilina del tipo P. A. M., ya demostrada en múltiples trabajos anteriores.

SUMMARY

Thirty-nine cases are presented, of which 34 had early syphilis and 5 had late syphilis. They were treated with G. procainic penicillin in oil with 2% aluminum monostearate (P. A. M.) in doses of 600,000 U. three times a week. for a total dosis of 9.000,000 U.

All cases are seronegative and clinically normal today. The three presenting a cardiovascular pathology cannot be attributed to deficiencies in the treatment.

COMMENTARY

The efficacy of the treatment of syphilis by a P. A. M. type penicillin, already shown in many previous reports, is again confirmed.

RESUME

On y présente 39 cas dont 34 de syphilis récents et 5 de syphilis tardive, traités avec de la pénicilline G. procainique en huile et monostéarate d'aluminium au 2/10 (P. A. M.), en doses de 600,000 U. trois fois par semaine, jusqu'à compléter les 9

millions de la dose totale.

A présent tous les cas sont séronnégatifs et cliniquement normaux, ne pouvant pas attribuer les 3 cas qui présentent une pathologie cardiovasculaire á des déficiences dans le traitement.

COMMENTAIRE

L'efficacité du traitement de la syphilis avec de la pénicilline dy type

1 .A.M., demontre déjà souvent dans plusieurs travaux précédents est une fois encore confirmée.

BIBLIOGRAFIA

1. —*Barquín López*, Estudio comparativo de dos tipos de tratamiento en 250 casos de lúes reciente. Bol. Soc. Cub. Derm. v Sif 12: 126, 1956.
2. —*Buckmlter, F. H. and Dickinson, H. K.*: A new Absorption-Delaying Vehide for Penicillin. J. A. Pharm. Assoc. 37: 472 1946.
3. —*Curtis, A. C., Kitchen, D. K., O'Leary, P. A., Rahner, H. Rein, C. R., Schoch, A. G., Sha/fer, L. W. and Wile, U. J.*: Penicillin Treatment of Synhilis. J. A. M. A.. 145- 16, 1951.
4. —*Mahoney, J. F., Arnold, R. C. and Harris. A.*: Penicillin Treatment of Early Syphi- lis: A preliminary Report. Ven. Dis. In- form, 24: 355. 1943.
5. —*Pardo, Osvaldo y Pardo Castelló, Vicente*: El tratamiento de la sífilis reciente con penicilina y sub-salicilato de bismuto. Bol. Soc. Cub. Derm. y Sif. 9: 63, 1952.
6. —*Pardo, Osvaldo*: Resultados obtenidos en el tratamiento de 188 casos de sífilis reciente con Penicilina y bismuto al cabo de 5 años. Bol. Soc. Cub. Derm. v Sif. 13: 35, 1956.
7. —*Rein, C. R.*: Estado actual del tratamiento de la sífilis por la Penicilina. Leído en el Symposium de Antibióticos, Oct. 1953, W ashington, D. C., Bol. Soc. Cub. Derm. v Sif. 10: 172, 1953.
8. —*Sternberg, T. H. y Leifer, W.*: Treatment of Early Syphilis with Penicillin. J. A. M. A.: 4-147.
9. —*Thomas, E. W., Lyons, R. H., Romansky, M. J., Rein, C. R. and Kitchen, D. K.*: Newer Repository Penicillin Products, J. A. M. A. 137- 1518, 1948.
10. —*Thomas. E. W., Rein, C. R., Landy, S. £., and Kitchen, D. K.*: Results of Treatment of Early Syphilis with a single inyection of Procaine Penicillin G. in Oil and Alu- minium Monoestearate. Am. J. Syph., Go- nor. & ven. Dis. 37: 374. 1953.