

Lepra en el Hospital Docente "Cmdte. M. Fajardo"

Por el Dr. GONZALO ESTÉVEZ DEL CRISTO

Este trabajo tiene como objeto presentar a ustedes la casuística de los enfermos de lepra del Hospital "Cmdte. M. Fajardo", señalando las características epidemiológicas más importantes de la misma.

Se hace mención a la terapéutica usada y al comportamiento evolutivo de los enfermos sometidos a tratamiento.

Caracteres epidemiológicos.

Las cifras estadísticas que ofrecemos a continuación corresponden al segundo semestre de 1965.

Número total de enfermos.

El número de enfermos que se asisten en el Servicio del Hospital "Cmdte. M. Fajardo" asciende a la cifra de 253. El número de enfermos registrados por primera vez en el año 1965 es de 14.

Sexo.

De los 253 enfermos señalados, 132 pertenecen al sexo masculino y 121 al sexo femenino. De las cifras antes dichas, el sexo masculino representa el 52% y el femenino el 48%, de lo que se desprende que no hay un predominio señalado en el sexo.

Edad.

Tenemos un solo caso menor de 15 años, los 252 restantes son adultos. Esto demuestra que el período de incubación de esta enfermedad es largo y, que además no poseíamos hasta fecha muy reciente los medios para poder examinar a los convivientes menores, que no asistían a nuestra consulta, siendo esto ya realizado por las Unidades Móviles del Programa de Control de Hansen del Ministerio de Salud Pública.

Formas clínicas.

Los casos están distribuidos en las siguientes formas clínicas.

Forma Clínica	N.E.	%
L	140	55
T	58	23
I	27	11
D	15	6
S.C.	13	5

Tenemos 13 casos sin clasificar debido a que llegan a nosotros sin lesiones activas ni secuelas que hablen a favor de determinada forma clínica.

Acciones de control.

La depuración del Registro de Enfermos del Hospital "Cmdte. M. Fajardo" fue la primera actividad realizada después del establecimiento del Programa de Control de Hansen del Ministerio de Salud Pública, logrando

la localización de cerca del 90% de los enfermos.

Enfermos bajo control.

Forma Clínica	N.E.	C	N.C.	
L	140	12 3	87.8%	17 12.2%
T	58	46	79.3	12 20.7
I	27	23	85.1	4 14.9
D	15	8	53.3	7 46.7
S.C.	13	13	100.0	0 0

Acción dinámica epidemiológica.

A la acción curativa que liemos mencionado se le añade la acción epidemiológica de pesquisa de casos y la labor preventiva de protección de los convivientes sanos. Los contactos leprominonegativos los tratamos profilácticamente con D. D. S., a razón de 50 mg dos veces por semana.

Evolución.

La mayor parte de los casos cuando hacen su tratamiento correctamente evolucionan favorablemente, involucionando sus lesiones, tornándose negativa su baciloscopia, regresando sus neuritis, etc.

Ahora bien, hay un menor número que evoluciona desfavorablemente, presentando brotes sucesivos. Las causas más frecuentes de estos brotes en nuestros casos son en orden de frecuencia: la intolerancia a la D.D.S., el stress psíquico, los focos sépticos, sobre todo apicales y el uso y abuso de los esteroides. En la actualidad, tres enfermos presentan brotes intensos y repetidos por haber usado durante largo tiempo ACTH y corticoides.

Tratamiento.

El medicamento que utilizamos con preferencia es la D. D. S. Damos una dosis

de 400 mg a la semana. Esto lo comenzamos a hacer después del VIII Congreso Internacional de Leprología de 1963, el cual recomienda esta dosis y no las que se utilizaban antes que eran el doble o el triple de la antes mencionada. Esta dosis pequeña ha reducido la incidencia de neuritis y de todos los tipos de reacción.

En los casos de intolerancia a la D. D. S. damos la difeniltiourea, o sea, la Ciba 1906, en dosis de 2 a 3 gramos diarios.

En algunos casos hemos asociado ambos medicamentos con resultados favorables.

En los brotes utilizamos preferentemente la cloroquina, la cual la damos en la siguiente forma: 2 tabletas al día durante 8 días, bajando después a 1 tableta al día durante 2 semanas y suspendiéndola posteriormente.

Contraindicamos el uso de ACTH y esteroides, excepto en casos especiales y durante un corto período de tiempo.

RESUMEN

Se ofrecen las cifras estadísticas del Servicio del Hospital "Cmdte. M. Fajardo" sobre los enfermos de lepra del mismo. Se señalan las características epidemiológicas de dichos enfermos y las normas terapéuticas trazadas para su control. Se estudian los factores desencadenantes de las reacciones leprosas que se presentan en los enfermos de nuestro Servicio.

SUMMARY

The statistical figures of the leprosy cases from the "Hospital Comandante M. Fajardo" are given.

The epidemiological characteristics of such cases and the therapeutic measures for their control are exposed. The

unchained factor of the leprosy reactions in our cases are studied.

RESUME

On y offre les chiffres statistiques du "Hospital Comandante Manuel Fajardo" sur les malades de lépre.

On y signale les caractéristiques épidémiologiques de ces malades et les normes thérapeutiques fixées pour son contrôle. On y fait une étude des facteurs déchainés des réssections de lépre qui se présentent dans les malades de notre service.